

Prospecto: Información para el usuario

Venamen®

Fracción flavonoide micronizada 500 mg

Comprimidos recubiertos
Vía oral

Composición

Cada comprimido recubierto contiene:
Fracción flavonoide micronizada.....533 mg
(Equivalente a 500 mg, conteniendo
Diosmina 450 mg y otros flavonoides
expresados en Hesperidina 50 mg).
Excipientes, c.s.

Acción Terapéutica

Venamen® es un medicamento
venotónico y vasculoprotector: aumenta
el tono de las venas y la resistencia de los
capilares (pequeños vasos sanguíneos).

Indicaciones

Tratamiento de las manifestaciones
de la insuficiencia venosa crónica de
los miembros inferiores, funcionales y
orgánicos. Sensación de pesadez, dolor,
calambres nocturnos.

Posología

2 comprimidos recubiertos al día,
preferentemente por la mañana con el
desayuno. El alivio de los síntomas se
produce, habitualmente, en las primeras
2 semanas de tratamiento.

Si el paciente no mejora o empeora,
se debe evaluar la situación clínica. En
caso de necesidad se puede continuar el
tratamiento, con la misma dosis diaria,
hasta 2-3 meses.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad conocida a los
flavonoides o a cualquiera de los
excipientes.

Interacciones

No se han realizado estudios específicos
sobre las posibles interacciones
farmacocinéticas y/o farmacodinámicas
de Venamen® con otros medicamentos

o con alimentos. Hasta la fecha no se
ha notificado ninguna interacción con
otros fármacos.

Advertencias y precauciones especiales de empleo

Se debe advertir a los pacientes que no
deben utilizar el medicamento de forma
prolongada sin control médico.

Niños y adolescentes:

No está dirigido al uso en niños y
adolescentes (menores de 18 años).

Embarazo y fertilidad

Si está embarazada, cree que podría
estar embarazada o tiene intención
de quedar embarazada, consulte
a su médico o farmacéutico antes
de utilizar este medicamento. No se
tiene constancia de ningún efecto
nocivo en la especie humana. Se
debe de extremar la precaución
en el uso de Venamen® durante el
embarazo, valorando adecuadamente el
posible beneficio de este medicamento
durante el mismo.

Lactancia

No se tiene constancia de que el
medicamento pase a la leche materna,
por lo que, no se aconseja su uso durante
la lactancia.

Efectos sobre la capacidad de conducir y utilizar maquinaria

No se considera que interfiera con la
capacidad de conducir vehículos o con la
del manejo de máquinas.

Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos,
este medicamento puede producir
efectos adversos, aunque no todas las
personas los sufran.

Reacciones adversas

- **Frecuentes**
 - Trastornos gastrointestinales
leves: náuseas, vómitos, diarrea,
dispepsia.
- **Raras**
 - Trastornos neurovegetativos: dolor
de cabeza, malestar, vértigo.

- **Trastornos cutáneos**

- Erupción
- Prurito
- Urticaria.

Sobredosis

No se han descrito casos de sobredosificación. El amplio margen terapéutico de esta especialidad determina que el riesgo de intoxicación sea prácticamente nulo.

Ante la eventualidad de una sobredosificación, dirigirse al hospital más cercano.

Condiciones de almacenamiento

Consérvese a temperatura inferior a 30 °C.

Presentación

Envase conteniendo 30 comprimidos recubiertos.

Venta bajo receta médica.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Fecha de última revisión de este prospecto: Abril 2022.

Fabricado por: Richam Internacional,
S.A. - Guatemala
Para: Latin Farma S.A. - Guatemala