

Disponible en:  -  -  -  -  -  -  - 

**Comprimidos**                      **recubiertos**                      -                      **Vía**                      **Oral**  
**Antihipertensivo**

### Composición

Cada comprimido recubierto de ZOFENIL<sup>®</sup> 15 mg contiene:  
Zofenopril cálcico .....15.00 mg [equivalente  
a            14.3            mg            de            Zofenopril            (DCI)]  
Lactosa            monohidrato            y            otros            excipientes,            c.s.

Cada comprimido recubierto de ZOFENIL<sup>®</sup> 30 mg contiene:  
Zofenopril cálcico .....30.00 mg [equivalente  
a            28.7            mg            de            Zofenopril            (DCI)]  
Lactosa            monohidrato            y            otros            excipientes,            c.s.

### Propiedades

ZOFENIL<sup>®</sup> contiene como principio activo al zofenopril cálcico, que pertenece a la familia de los medicamentos llamados inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina (IECA).

### Indicaciones

Está indicado para el tratamiento de la hipertensión leve a moderada.

También se utiliza para el tratamiento del infarto agudo de miocardio, iniciado dentro de las primeras 24 horas, en pacientes con o sin signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, que no hayan recibido terapia con trombolíticos.

### Posología

El médico le indicará la dosis que debe tomar cada día y la duración del tratamiento.

## **Hipertensión**

Normalmente, la dosis inicial es de 15 mg de ZOFENIL<sup>®</sup> vía oral, una vez al día.

Los efectos antihipertensivos a largo plazo se consiguen usualmente con 30 mg de ZOFENIL<sup>®</sup> una vez al día. El médico puede prescribirle incluso una dosis de 60 mg de ZOFENIL<sup>®</sup>. En insuficiencia renal o hepática se sugiere iniciar la mitad de la dosis de ZOFENIL<sup>®</sup>.

En algunos pacientes que estén tomando otros medicamentos para la presión arterial, puede ser necesario iniciar el tratamiento con 7.5 mg de ZOFENIL<sup>®</sup>. La dosis debe ser ajustada en base a los requerimientos individuales. Su médico le ajustará gradualmente la dosis hasta encontrar la más adecuada que le corresponda. La dosis máxima son 60 mg de ZOFENIL<sup>®</sup> al día, divididos en 2 dosis de 30mg cada una.

## **Infarto agudo de miocardio:**

El tratamiento con ZOFENIL<sup>®</sup> debe empezar dentro de las siguientes 24 horas después del inicio de los síntomas, y debe ser continuado durante las seis semanas siguientes.

La dosis recomendada es la siguiente:

- 7.5 mg de ZOFENIL<sup>®</sup> vía oral dos veces al día durante el 1er y 2o día de tratamiento.
  - 15 mg de ZOFENIL<sup>®</sup> vía oral , dos veces al día durante el 3o y 4o día de tratamiento.
  - A partir del 5o día en adelante, la dosis debe incrementarse a 30 mg de ZOFENIL<sup>®</sup> vía oral, dos veces al día.
- Para la terapia de mantenimiento, su médico le ajustará la dosis en función de sus requerimientos individuales. .

## **Precauciones**

Alergia a alguno de los componentes del fármaco, alteración de la función hepática o renal.

## **Advertencias**

Disfunción hepática o renal. Si se administran durante el segundo y tercer trimestre del embarazo, los inhibidores de la enzima de conversión de angiotensina (grupo al que pertenece este producto) pueden causar daño y muerte fetal. Si se detecta embarazo durante el tratamiento, la administración de este medicamento debe ser suspendida lo antes posible. ZOFENIL<sup>®</sup> no debe tomarse si se está en período de lactancia.

Uso en niños ZOFENIL<sup>®</sup> no se debe administrar a los niños, ya que se desconoce el efecto del medicamento en ellos.

Uso en ancianos: Se debe vigilar, cuando se administra ZOFENIL<sup>®</sup> a pacientes con infarto agudo de miocardio mayores de 75 años.

## **Interacciones**

- Las bebidas alcohólicas incrementan el efecto de este medicamento.
- Otros medicamentos para la presión arterial elevada, por ejemplo, diuréticos.
- Litio, alopurinol, ansiolíticos, cimetidina, ciclosporina, corticosteroides, procainamida, insulina, antiinflamatorios no esteroideos, antiácidos.

## **Sobredosis**

Consulte al médico.

## **Efectos**

## **Adversos**

Como todos los medicamentos, ZOFENIL<sup>®</sup> puede tener efectos adversos los cuales son reversibles y desaparecen al finalizar el tratamiento.

Pueden ocurrir las siguientes reacciones adversas: hipotensión, somnolencia, sensación de debilidad, visión alterada, función renal reducida y tos.

**Presentaciones**

ZOFENIL<sup>®</sup> 15 mg: estuches con 28 comprimidos recubiertos.

ZOFENIL<sup>®</sup> 30 mg: estuches con 14 y 28 comprimidos recubiertos.

**Venta                      bajo                      receta                      médica.**  
**Manténgase fuera del alcance de los niños.**