

Lacto Digestomen®

Lactasa 9,000 FCC

Cápsulas - Vía oral

Composición

Cada cápsula contiene

Lactasa 9,000 FCC equivalente a..... 94.500 mg

(Procedente de *Aspergillus oryzae*)

Excipientes, c.s.

Propiedades

La lactasa es una enzima obtenida de la fermentación controlada de *Aspergillus oryzae* y se caracteriza por su capacidad de descomponer el azúcar de la leche (lactosa) en compuestos más fácilmente digeribles, que permite a las personas que tienen su enzima natural comprometida, disfrutar sin ninguna molestia de los productos lácteos.

Indicaciones

Puede mejorar la absorción de lactosa en pacientes con deficiencia primaria, secundaria y congénita de la enzima lactasa.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al producto o a cualquiera de sus componentes.

Efectos secundarios

Pueden aparecer raramente reacciones alérgicas tales como erupción cutánea, picor o urticaria, hinchazón de la cara, labios, lengua o problemas respiratorios. Ocasionalmente puede presentarse constipación, plenitud abdominal y vómitos los cuales desaparecen al suspender el consumo de este producto.

Precauciones generales

La lactasa deberá administrarse con precaución en ancianos o con antecedentes de alergia o hipersensibilidad (urticaria, eccema, asma bronquial). Se debe recordar que al hidrolizar la lactosa estarán disponibles la glucosa y la galactosa para metabolizar, lo que debe ser tomado en cuenta por los pacientes diabéticos. Su uso no es recomendable para niños menores de 8 años, salvo indicación profesional competente y no reemplaza a una alimentación balanceada.

Principales interacciones

El uso con prebióticos o yogur aumenta el efecto de la lactasa, al reducir el nivel de lactosa a hidrolizar.

Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia

No se han documentado problemas debido al uso de este producto en mujeres embarazadas ni en período de lactancia. Sin embargo si la paciente se encuentra embarazada, debe de consultar

a su médico antes de utilizar este producto. No existen estudios sobre la excreción de la misma en la leche materna.

Posología

La administración de este producto es por vía oral.

El grado de insuficiencia a lactosa varía entre pacientes y además el contenido de lactosa varía en los diferentes alimentos, por lo tanto la dosis puede requerir un ajuste individualizado en función del grado de intolerancia y la cantidad de productos lácteos a consumir.

Uso sugerido: tomar 1 cápsula al comienzo de cada comida que contenga productos lácteos. Ingiera este producto con el primer bocado o al ingerir productos lácteos. Si sigue consumiendo alimentos que contienen productos lácteos después de 20 a 45 minutos, tome otra cápsula. Si olvida una dosis de lactasa, tómela tan pronto como sea posible.

No tome este producto con más frecuencia que la indicada.

Sobredosificación

Ante la eventualidad de una sobredosificación, consulte con el médico o acuda de inmediato al hospital más cercano.

Condiciones de almacenamiento

Consérvese a temperatura inferior a 30 °C.

Presentaciones

Estuches con 30 y 100 cápsulas.

Venta libre

Manténgase fuera del alcance de los niños

Este prospecto ha sido aprobado en junio de 2016.

Fabricado por:
Richam Internacional, S.A. - Guatemala
Para: Latin Farma, S.A. - Guatemala