



Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar el medicamento.

- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado a Ud. personalmente y no debe darlo a otras personas. Puede perjudicarles, aun cuando los síntomas sean los mismos que los suyos.

En este prospecto:

1. Qué es Folimen® 5 mg comprimidos y para qué se utiliza.
2. Antes de usar Folimen® 5 mg comprimidos.
3. Cómo tomar Folimen® 5 mg comprimidos.
4. Posibles efectos adversos.
5. Conservación de Folimen® 5 mg comprimidos.

FOLIMEN® 5 mg Comprimidos (Ácido Fólico)

Vía oral

1. QUÉ ES FOLIMEN® 5 MG COMPRIMIDOS Y PARA QUÉ SE UTILIZA

Este medicamento se presenta en forma de comprimidos. Cada comprimidos contiene 5 mg de ácido fólico como principio activo, lactosa, almidón de maíz y otros excipientes.

Folimen® 5 mg comprimidos pertenece al grupo de medicamento denominados preparados antianémicos y está indicado en:

- Prevención y tratamiento de situaciones que cursan con déficit de ácido fólico, como anemias megaloblásticas, malnutrición, síndrome de malabsorción o pacientes sometidos a diálisis, o con aumento de requerimientos, como durante el embarazo.
- Prevención y tratamiento del déficit del ácido fólico, en mujeres embarazadas para prevenir defectos en el tubo neural (espina bífida, encefalocele, anencefalia), y otros defectos congénitos, especialmente en mujeres con antecedentes de hijo o feto con estas deficiencias en el tubo neural.

2. ANTES DE USAR FOLIMEN® 5 MG COMPRIMIDOS

No tome Folimen® 5 mg comprimidos si:

- Es alérgico o hipersensible al ácido fólico o a cualquiera de los componentes de Folimen® 5 mg comprimidos.
- Padece anemia perniciosa addisoniana o anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12.

Tenga especial cuidado con Folimen® 5 mg comprimidos:

Si padece:

- Anemia de origen desconocido.

Uso de otros medicamento:

Informe a su médico o farmacéutico si esta utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta.

Folimen® 5 mg comprimidos puede interaccionar con otros medicamento, como anticonceptivos orales, antipiréticos (fenitoína, primidona), antituberculosos, antagonistas del ácido fólico (metotrexato, sulfonamidas, trimetoprim) y también con el alcohol.

El uso de medicamento que contienen cloranfenicol, puede reducir la respuesta al tratamiento con Folimen® 5 mg comprimidos en pacientes con déficit de folatos.

El uso de Folimen® 5 mg comprimidos puede potenciar la toxicidad del 5-fluorouracilo.

Embarazo y lactancia:

Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento.

El ácido fólico puede utilizarse con seguridad durante el embarazo y la lactancia.

El ácido fólico se excreta en la leche materna.

Conducción y uso de máquinas:

No se han descrito efectos sobre la capacidad para conducir vehículos y utilizar maquinaria.

Información importante sobre alguno de los componentes de Folimen® 5 mg comprimidos:

Este medicamento contiene lactosa. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.





3. CÓMO TOMAR FOLIMEN® 5 MG COMPRIMIDOS

Siga las instrucciones de administración de Folimen® 5 mg comprimidos indicadas por su médico. Consulte a su médico o farmacéutico si tiene dudas.

Folimen® 5 mg comprimidos se administra por vía oral. La dosis habitual es:

- Para la prevención de defectos en el tubo neural: se recomienda una dosis de 5mg/día (1 comprimido) durante 4 semanas antes de la concepción y los tres primeros meses de gestación.
- Para el tratamiento de anemia megaloblástica: se recomienda una dosis de 5 mg/día (1 comprimido) durante 4 meses; puede ser necesario hasta 15 mg (3 comprimidos) en casos de malabsorción.
- Para el tratamiento de estados carenciales: se recomienda una dosis de 5 - 15 mg/día (1 a 3 comprimidos).

Si Ud. toma más Folimen® 5 mg comprimidos del que debiera:

No se han notificado casos de sobredosis.

Si olvidó tomar Folimen® 5 mg comprimidos:

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Si interrumpe el tratamiento con Folimen® 5 mg comprimidos

Su médico le indicará la duración del tratamiento. No suspenda el tratamiento antes aunque se sienta mejor.

4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Como todos los medicamentos, Folimen® 5 mg comprimidos puede tener efectos adversos.

Algunas reacciones adversas de rara frecuencia son alteraciones gastrointestinales (anorexia, diarrea, náuseas, vómitos) o reacciones alérgicas y de hipersensibilidad individual al fármaco (eritema, prurito, erupciones exantemáticas).

Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si apareciera cualquier efecto adverso, informe a su médico o farmacéutico.

5. CONSERVACIÓN DE FOLIMEN® 5 MG COMPRIMIDOS

Mantener Folimen® 5 mg comprimidos fuera del alcance y de la vista de los niños.

Conservar a temperatura inferior a 30 °C. Conservar en el envase original.

Caducidad:

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

Modalidad de venta:

Venta libre: Honduras.

Venta bajo receta médica: Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica , Panamá y República Dominicana.

Fecha de la última revisión de este prospecto:

Noviembre 2016.

Fabricado por:

Laboratorios Menarini, S.A. - España

Para:

Latin Farma, S.A. - Guatemala

338804

