

Folimen® 1 mg

Ácido fólico

Comprimidos - Vía oral

Composición

Cada comprimido contiene:

Ácido fólico (DCI) 1 mg

Lactosa, almidón de maíz y otros excipientes, c.s.

Propiedades

El ácido fólico actúa como cofactor en la síntesis de ADN, resultando por tanto imprescindible para el crecimiento celular.

El ácido fólico está presente en numerosos alimentos, pero es destruido en los procesos de cocción. Su deficiencia puede resultar de la dieta inadecuada o bien por alteraciones de su absorción intestinal.

El aporte insuficiente de ácido fólico al organismo afecta al sistema hematopoyético, debido a su alta velocidad de división celular, dando lugar a anemia megaloblástica, que no puede diferenciarse de la causada por la vitamina B12.

La aparición de anemia megaloblástica consecuente a la privación del aporte de ácido fólico es muy rápida, pues sus reservas en el organismo son limitadas.

Indicaciones

Anemia megaloblástica. Anemias asociadas a esprúe o enfermedad celíaca.

Situaciones que precisan un aporte suplementario de ácido fólico. Anemia hemolítica, talasemia, embarazo y lactancia.

Posología

2 a 4 comprimidos (2 a 4 mg) al día.

Embarazo y lactancia: 1 comprimido (1 mg) diariamente.

La dosis puede cambiar a criterio del médico.

Contraindicaciones

Si es alérgico (hipersensible) al principio activo o a cualquiera de los excipientes del comprimido.

Si padece anemia por déficit de Vitamina B12, por aumentar los requerimientos de ésta.

Información importante sobre alguno de los componentes de Folimen® 1 mg

Este medicamento contiene lactosa. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.

Incompatibilidades

Folimen® puede interactuar con los antagonistas del ácido fólico (metotrexato),

antiepilépticos, anticonceptivos orales, analgésicos (uso prolongado), esteroides, sulfasalazina y alcohol.

Se ha descrito que, en pacientes con deficiencia de ácido fólico, una administración concomitante de cloranfenicol y ácido fólico muestra efectos antagonistas.

El uso de Folimen® 1 mg comprimidos puede potenciar la toxicidad del 5-fluorouracilo.

Embarazo y lactancia

El ácido fólico puede utilizarse con seguridad durante el embarazo y la lactancia.

Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar maquinaria

No es probable que puede alterarse su habilidad para conducir vehículos o manejar maquinaria peligrosa. No obstante, al inicio del tratamiento debería tener cuidado al realizar estas tareas hasta que conozca como tolera el tratamiento.

Sobredosis

En caso de intoxicación o sobredosis, el paciente debe acudir a su médico o a un centro hospitalario.

Efectos secundarios

Reacciones alérgicas, eritema, fiebre, sarpullido y picazón.

Reacciones digestivas: náuseas, distensión abdominal, flatulencia y trastornos del gusto (sabor amargo).

Condiciones de almacenamiento

Consérvese a temperatura inferior a 30 °C.

Presentación

Caja con 100 comprimidos.

Venta libre: Guatemala, Honduras.

Venta bajo receta médica: El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Rep. Dominicana.

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.

Fabricado por: Laboratorios Menarini, S.A. - España

Para: Latin Farma, S.A. - Guatemala

Fecha de revisión del prospecto: Agosto 2019.

339104