

ANESTÉSICO DENTAL

ODDONTO Prilo®

Prilocaina clorhidrato 4%

Solución Inyectable

Vía de Administración: Infiltración o Bloqueo de Nervio

¿QUÉ CONTIENE ESTE PROSPECTO?

ODDONTOPrilo® es un medicamento que se usa para detener el dolor durante los procedimientos dentales.

Este prospecto responde algunas preguntas comunes acerca de ODDONTOPrilo®. No contiene toda la información que se conoce sobre ODDONTOPrilo®.

Tampoco reemplaza el hecho de consultar a su dentista, enfermera dental o farmacéutico.

Todos los medicamentos poseen riesgos y beneficios. Su dentista realizará una evaluación en cuanto a los riesgos de administrarle ODDONTOPrilo® contra los beneficios esperados para usted.

Si tiene alguna duda respecto a este medicamento, puede preguntar directamente a su dentista, enfermera dental o farmacéutico.

Conserve este prospecto, puede que necesite leerlo otra vez.

¿PARA QUÉ SIRVE ODDONTOPRILLO®?

ODDONTOPrilo® se usa para prevenir o aliviar el dolor durante los procedimientos dentales, pero no lo adormecerá.

ODDONTOPrilo® pertenece al grupo de medicamentos conocidos como anestésicos locales. La solución se inyecta en el cuerpo, haciendo que los nervios no puedan transmitir mensajes al cerebro.

Dependiendo de la cantidad que se utilice, ODDONTOPrilo® puede detener por completo el dolor o puede causar una pérdida parcial de la sensibilidad.

Su dentista tendrá que explicarle la razón por la cual está tratándolo con ODDONTOPrilo®

Siga cuidadosamente todas las instrucciones que le dé su dentista. Puede que difieran de la información contenida en este prospecto. Para más información consulte a su dentista.

ODDONTOPrilo® no es adictivo.

ANTES DE UTILIZAR ODDONTOPRILLO®

No utilizar ODDONTOPrilo®:

No utilice ODDONTOPrilo® si está embarazada o en periodo de lactancia a menos que su médico o dentista lo indique. Consulte con su médico o dentista sobre los riesgos y beneficios de la administración de ODDONTOPrilo® durante el embarazo.

ODDONTOPrilo® ha sido utilizado ampliamente para procedimientos dentales durante el periodo de embarazo y no se ha reportado ningún efecto adverso en la madre o el niño.

Se desconoce si ODDONTOPrilo® pasa a la leche materna.

ODDONTOPrilo® solo se utilizará si la solución es transparente,

si el empaque no está dañado y si no ha pasado la fecha de vencimiento que se indica en el empaque.

ANTES DE UTILIZAR ODDONTOPRILLO®

Deberá informar a su dentista si:

1. Es alérgico a:

- Otros anestésicos locales, por ejemplo lidocaína.
- Alguno de los ingredientes que se listan al final de este prospecto.
- Cualquier otra sustancia.

Si usted posee alguna reacción alérgica, puede experimentar erupciones cutáneas, rinitis alérgica, dificultad para respirar o sentirse débil.

2. Si padece cualquiera de estos problemas de salud:

- Un problema de la sangre llamado Metahemoglobinemia.
- Problemas con su presión arterial o circulación.
- Envenenamiento de la sangre.
- Problemas con su coagulación sanguínea.
- Problemas del sistema nervioso.
- Problemas cardíacos.
- Problemas hepáticos.
- Problemas renales.
- Hipertermia maligna.
- Infección o inflamación en el sitio de administración.

Si padece alguna de estas afecciones, puede que la administración de ODDONTOPrilo® no sea segura.

3. Si está tomando:

- Mexiletina.
- Cualquier otro medicamento, incluyendo los que compra en la farmacia, el supermercado, o en las tiendas de suplementos nutricionales.

Estos medicamentos pueden afectar la forma en que trabaja ODDONTOPrilo®.

Su dentista puede indicarle qué hacer si está tomando cualquiera de estos medicamentos.

Si no le ha comentado esto a su dentista, hágalo antes de que él/ella pueda administrarle ODDONTOPrilo®

¿CÓMO SE ADMINISTRA ODDONTOPRILLO®?

El dentista inyectará ODDONTOPrilo® en la piel dentro de su boca, cerca de un solo nervio o en un área en donde hay un grupo de nervios.

Esto dará como resultado el entumecimiento en el sitio o cerca del sitio de administración.

ODDONTOPrilo® no se debe inyectar directamente en la sangre.

La dosis que se le administrará dependerá de la talla de su cuerpo, edad y tipo de trabajo dental que le realizarán.

Su dentista deberá tener experiencia inyectando ODDONTOPrilo® u otros anestésicos locales, y sabrá elegir la dosis adecuada para su caso. Su dentista estará dispuesto a dialogar esta decisión con usted.

SOBREDOSIS

El dentista que le administre ODDONTOPrilo® tendrá experiencia en el uso de anestésicos locales, por lo tanto, es poco probable que ocurra una sobredosis.

Sin embargo, si usted es sensible particularmente a ODDONTOPrilo® o si la dosis se inyecta accidentalmente en la

sangre puede experimentar efectos por un tiempo breve. Es posible que sienta entumecimiento dentro o alrededor de su boca, también puede sentirse mareado o tenso, o puede tener espasmos musculares.

Cuando se le administre ODDONTOPrilo®, el equipo adecuado estará disponible para atenderlo si ocurre una sobredosis.

DURANTE SU USO
Cosas que no debe hacer

No coma ni beba nada hasta que recupere la sensibilidad en su boca. Si lo hace antes puede quemarse o morderse.

Precauciones
Tenga precaución al conducir o usar máquinas hasta que sepa los efectos que ODDONTOPrilo® le causa. Puede causar somnolencia, provocando que sus reflejos sean lentos.

No beba alcohol inmediatamente antes o después de que le administren ODDONTOPrilo®. Si bebe alcohol durante la administración de ODDONTOPrilo® su presión arterial puede disminuir, lo que le puede provocar mareos y desmayos.

Consulte con su dentista, enfermera dental o farmacéutico sobre estas posibilidades si cree que puede afectarlo.

Este medicamento contiene menos de 23 mg (1 mmol) de sodio por cápsula, por lo que se considera esencialmente “exento de sodio”.

Este medicamento contiene 1 mg de Benzoato de sodio en cada mL que es equivalente a 1,800 mg en 1,800 mL de producto.

El benzoato de sodio puede aumentar el riesgo de ictericia (coloración amarillenta de la piel y los ojos) en los recién nacidos (hasta de 4 semanas de edad).

EFFECTOS ADVERSOS
Informe de inmediato a su dentista o enfermera dental si no se siente bien durante la administración de ODDONTOPrilo®.

ODDONTOPrilo® ayuda a la mayoría de personas a no sentir dolor durante las visitas al dentista, pero puede causar efectos secundarios no deseados en algunas personas.

Todos los medicamentos poseen efectos adversos. Algunas veces estos pueden ser graves, pero generalmente no lo son. Puede que necesite algún tratamiento médico si le ocurre alguno de estos efectos.

Consulte con su dentista, enfermera dental o farmacéutico para responder cualquier duda que tenga.

Informe a su dentista si experimenta alguno de los siguientes síntomas:

- Nerviosismo.
- Mareo.
- Visión borrosa.
- Somnolencia.
- Zumbido en los oídos.
- Entumecimiento.
- Desorientación.
- Náuseas.
- Vómitos.

Todos estos son efectos adversos leves de ODDONTOPrilo®

Informe a su dentista de inmediato si ocurre lo siguiente:

- Si se siente sobresaltado.

- Ritmo cardíaco acelerado (palpitaciones).

Estos son efectos adversos graves y puede que necesite atención médica urgente. Los efectos adversos graves son raros.

Si ODDONTOPrilo® se administra de forma incorrecta, o si usted es muy sensible al mismo, algunas veces podría causar:

- Ataques.
- Inconciencia.
- Problemas respiratorios.
- Baja presión arterial.
- Ritmo cardíaco lento.
- Colapso.

Estos son efectos adversos muy graves. Si alguno le ocurre, es posible que haya tenido una reacción (alérgica) grave a ODDONTOPrilo® y podría necesitar atención médica urgente u hospitalización.

Todos estos efectos adversos son muy raros.

Informe a su dentista si observa alguna otra reacción que lo haga sentir mal.

Algunas personas pueden experimentar otros efectos secundarios durante la administración de ODDONTOPrilo®

DESPUES DE UTILIZARLO
Almacenamiento

Manténgase fuera del alcance de los niños

ODDONTOPrilo® será almacenado por su dentista bajo las condiciones recomendadas.

ODDONTOPrilo® debe conservarse en un lugar fresco a una temperatura inferior a 30°C.

ELIMINACIÓN
Su dentista está encargado de deshacerse, de manera segura, de cualquier ODDONTOPrilo® de una sola dosis que ya no se use.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
ODDONTOPrilo® es una solución transparente e incolora y está disponible en la siguiente presentación:
Presentación Comercial: Caja de cartón conteniendo 50 cápsulas de vidrio de borosilicato tipo I de 1.8 mL.

Composición por cápsula
Prilocaina Clorhidrato..... 72.00 mg
Cloruro de sodio, benzoato de sodio, hidróxido de sodio c.s.p. ajustar pH 6.4, agua destilada c.s.p. 1.8 mL

Fabricado por: Productora y Comercializadora Odontológica New Stetic, S.A. – Colombia
Para: Latin Farma, S.A. – Guatemala

Fecha de revisión: Mayo 2023.

Venta bajo receta médica