



Spasmoctyl® Pediátrico

Otilonio bromuro

Grageas - Vía oral

Presentación

Envase con 30 grageas.

Venta libre: El Salvador.

Venta bajo receta médica: Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Rep. Dominicana.

Composición

Cada gragea contiene:

Otilonio bromuro (DCI) 10 mg

Excipientes, c.s.

**Manténgase fuera del alcance
de los niños**

Propiedades

Spasmoctyl® Pediátrico posee una actividad espasmolítica selectiva sobre la musculatura lisa del canal digestivo sin presentar efectos colaterales de tipo atropínico, ni influir sobre la tensión arterial.


Fabricado por:

Laboratorios Menarini, S.A.

Badalona (Barcelona), España

Indicaciones

Estados espásticos y discinesias funcionales del aparato gastroentérico (colon irritable, gastritis y gastroduodenitis, enteritis, afecciones esofágicas).



Vómito habitual del niño: piloroespasmo, enteropatía diarreica, estreñimiento espasmódico.

Contraindicaciones

No debe administrarse en la obstrucción intestinal.

Incompatibilidades y efectos secundarios

No se han descrito.

Precauciones

Se aconseja administrar este producto con precaución en los casos de glaucoma.

Intoxicación y su tratamiento

En caso de administración accidental excesiva del producto, debe provocarse la evacuación del fármaco y proceder a un lavado gástrico. Puede requerirse tratamiento médico.

Posología

Niños a partir de los 4 años se puede administrar de 1/2 a 3 grageas al día (5 mg a 30 mg), siempre en función de la clínica presentada y a juicio del médico.

Condiciones de almacenamiento

Consérvese a temperatura inferior a 30 °C.

589305

