



- Si la bomba de pulverización se obstruye, quítela con cuidado hacia arriba (Ver Figura 11).



Figura 11

- Retire el tapón protector y coloque **solamente la bomba de pulverización** en agua tibia y remójela. (Ver Figura 12).



Figura 12

- Después de aproximadamente 15 minutos de remojo, enjuague la bomba de pulverización y el tapón con agua tibia. (Ver Figura 13).



Figura 13

- Deje que la bomba de pulverización se seque completamente. Cuando esto ocurra, coloque el tapón protector en la boquilla de la bomba de pulverización y coloque nuevamente la bomba de pulverización en el frasco. (Ver Figura 14)



Figura 14

- Después de haber realizado los pasos para desobstruir el frasco, deberá volver a prepararlo. Revise la sección anterior “Cómo utilizar Ryaltris®: Paso 1 – Prepare el frasco para la pulverización nasal” para saber cómo hacerlo. Una vez preparado, vuelva a colocar el tapón protector y Ryaltris® estará listo para su uso.
- Repita las instrucciones para desobstruir el frasco, cuando sea necesario.

SOBREDOSIS

Con la vía de administración nasal no se prevén reacciones de sobredosis.

Si cree que usted, o alguna persona a la que cuida, ha recibido una dosis excesiva de Ryaltris®, o si Ryaltris® ha sido ingerido accidentalmente póngase en contacto inmediatamente con un profesional sanitario, o con el servicio de urgencias de un hospital o centro toxicológico local, aunque no presente síntomas.

Si olvidó su dosis

Si olvida una dosis, omítala y administre la siguiente dosis a la hora prevista. No administre una dosis doble.

¿CUÁLES SON LOS POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS AL USAR RYALTRIS®?

Estos no son todos los posibles efectos secundarios que puede sufrir al usar Ryaltris®. Si experimenta algún efecto secundario que no aparezca en esta lista, informe a su profesional sanitario.

Los efectos secundarios pueden incluir:

- Somnolencia
- Fatiga
- Dolor de cabeza
- Alteración del sentido del gusto
- Hemorragias nasales, molestias nasales, costras o ampollas en la nariz
- Tos
- Irritación de garganta
- Infección de las vías respiratorias altas

Efectos secundarios graves y cómo tratarlos			
Síntomas / Efectos	Consulte a su profesional sanitario		Deje de tomar el medicamento y busque ayuda médica inmediatamente
	Solo si es grave	En todos los casos	
CÓMUN			
Infección urinaria (infección en el sistema urinario, incluyendo riñones, vejiga y uretra): Dolor o sensación de ardor al orinar, micción frecuente, sangre en la orina, dolor en la pelvis, orina con olor fuerte o turbia.	X		
RARO			
Perforación del tabique nasal (pequeños orificios en la pared entre las dos fosas nasales): un silbido al respirar.		X	

Efectos secundarios graves y cómo tratarlos			
Síntomas / Efectos	Consulte a su profesional sanitario		Deje de tomar el medicamento y busque ayuda médica inmediatamente
	Solo si es grave	En todos los casos	
Infección fúngica en la nariz o la garganta: cualquier enrojecimiento o manchas de color blanco en la nariz o la boca.		X	
Cataratas: deslumbramiento, disminución de la visión.		X	
Glaucoma: aumento de la presión ocular, dolor ocular.			X
Infección: fiebre, dolores o molestias, escalofríos, sensación de cansancio.		X	
Disminución de la función suprarrenal: cansancio, debilidad, náuseas, vómitos.		X	

Si tiene algún síntoma preocupante o efecto secundario que no aparezca en esta lista o se agrava lo suficiente como para interferir con sus actividades diarias, informe a su profesional sanitario.

NOTIFICACIÓN DE EFECTOS SECUNDARIOS

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte con su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

Conservación

Mantener Ryaltris® en posición vertical con su tapón protector puesto.

Consérvese a temperatura inferior a 30 °C.

Proteger de la luz. No congelar ni refrigerar.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

PRESENTACION

Caja conteniendo frasco con 120 pulverizaciones.

Venta bajo receta médica.

Fabricante
Glenmark Pharmaceuticals Limited - India

Titular
Latin Farma, S.A. – Guatemala

Última revisión: 21 de septiembre de 2022

Atención al consumidor: servicioalcliente@menarini-ca.com

