

SITOCURA[®]

Hedera helix L. / *Coptis chinensis* Franchet

Jarabe

Vía oral

COMPOSICIÓN:

Cada 100 ml contienen:

Extracto seco de Rizoma de Coptis (*Coptis chinensis* Franchet) 87.5 mg

Extracto seco de hoja de Ivy (*Hedera helix* L.) en etanol al 30% 262.5 mg

Excipientes: sorbitol y otros excipientes c.s.

INDICACIONES:

Producto natural, con efecto expectorante y antitusivo, utilizado para el tratamiento de los síntomas asociados a las vías respiratorias superiores y bronquitis crónica inflamatoria facilitando la expulsión de flemas.

POSOLOGÍA Y MODO DE EMPLEO:

- 2 - 6 años: 5 ml, 3 veces al día.
- 7 - 14 años: 10 ml, 3 veces al día.
- Mayores de 15 años y adultos: 15 ml, 3 veces al día.

La duración del tratamiento depende del tipo y de la severidad del cuadro clínico, el tratamiento debe durar como mínimo una semana.

No exceder la dosis recomendada.

Si los síntomas persisten consulte a su médico.

CONTRAINDICACIONES:

- Pacientes con hipersensibilidad a alguno de los componentes del producto.
- Este producto contiene sodio. Debe tenerse en cuenta en los pacientes con una dieta baja en sodio.
- Contiene sorbitol. Los pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa no deben tomar éste producto.
- No administrar este producto a pacientes con tos persistente o crónica, si la tos está acompañada de moco, consultar antes al médico.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE EMPLEO:

- SITOCURA[®] Jarabe no debe ser administrado en personas hipersensibles al ingrediente activo o a cualquiera de sus excipientes.
- Pacientes con gastritis y úlcera péptica.
- Pacientes con neumonía, asma incontrolable, virus de la influenza, tuberculosis.
- Pacientes con tumor maligno, enfermedad severa del sistema nervioso central y desorden metabólico severo.
- Pacientes con discapacidad cardíaca como insuficiencia cardíaca.
- Pacientes con discapacidad renal severa o discapacidad hepática.
- Pacientes con diabetes no controlada y severa e hipertensión.
- Pacientes con diarrea y fiebre, asociados a sangre y mocos en las heces.

EFFECTOS ADVERSOS:

1. Sistema Digestivo: diarrea, dispepsia, dolor epigástrico, vómito, náuseas.
2. Sistema Neuropsiquiátrico: cefalea, mareos, neurosis faríngea.
3. Sistema Respiratorio: dolor de garganta, nasofaringitis, dolor de las vías respiratorias superiores, cambio de voz.
4. Otros efectos adversos: fiebre, mialgia, eritema, picazón, urticaria, etc.

INTERACCIONES:

Otros antitusivos y expectorantes que contengan codeína y dextrometorfano.

Analgésicos gastrointestinales y antiespasmódicos.

EMBARAZO Y LACTANCIA:

La seguridad del uso durante el embarazo y lactancia no ha sido establecida. Solamente se debe de tomar este producto si es necesario, siempre bajo supervisión del médico.

USO PEDIÁTRICO:

No se ha establecido la seguridad y la eficacia de este producto en niños menores de 24 meses, solamente deben ingerirlo si es realmente necesario y bajo supervisión del médico.

USO EN ADULTOS MAYORES:

No se ha establecido la seguridad y eficacia de este producto en pacientes mayores de 75 años, solamente deben ingerirlo si es realmente necesario y bajo supervisión del médico.

SOBREDOSIS:

Ingerir grandes cantidades (más de 3 veces la dosis diaria) puede causar náusea, vómitos, diarrea y agitación.

INTOXICACIÓN:

Seguir las instrucciones del médico en caso de intoxicación.

EFFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD PARA CONDUCIR VEHÍCULOS Y UTILIZAR MÁQUINAS:

No se han visto efectos en la habilidad para operar máquinas.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Consérvese a temperatura inferior a 30 °C.

PRESENTACIONES:

Sitocura® Jarabe, cajas con 15 y 78 sobres con 10 ml de jarabe cada uno.
Sitocura® Jarabe, cajas con 15 y 60 sobres con 15 ml de jarabe cada uno.

Venta libre.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Última fecha de revisión: Agosto 2018

Fabricado por: Ahngook Pharmaceutical. CO., Ltd. - Corea
Para: Latin Farma, S.A. - Guatemala